

Salus srl	PREPARAZIONE BIOPSIA PROSTATICA TRANSRETTALE	Rif.: OQ7.5ARG10-All.1	Pagina:
Emittente: Direzione Sanitaria		Data di Emiss.ne: 20/11/2017	Data Agg.1: 15/01/2018
		Data Agg.2:	Data Agg.3:

- La sera precedente il giorno dell'esame cena leggera e clistere evacuativo (Clisma Fleet acquistabile in farmacia)
- Al mattino del giorno dell'esame colazione a base di soli liquidi (the, latte, ect.) e presentarsi all'ora indicata presso la Salus srl in via Vaccari 1 a Belluno, muniti della richiesta specialistica con la MOTIVAZIONE.

Portare gli esiti recenti dei seguenti esami del sangue :

- PSA (**ultimo esame effettuato**)
- PT (tempo di protrombina o tempo di Quick)
- PTT (tempo di tromboplastina parziale)

PROFILASSI ANTIBIOTICA (consultare il Medico curante)

- a partire dalla sera precedente l'esame mediante assunzione orale di antibiotico .Assumere ad esempio UNIDROX 600 1 cp alla sera e poi continuare alla sera per 4 gg, oppure BACTRIM 1 + 1 al dì cominciando il gg prima e continuando per 6 gg dopo la biopsia.
- nei giorni successivi l'esecuzione della biopsia è necessaria un'abbondante assunzione di liquidi (almeno due litri).
- Si potrà verificare l'emissione ripetuta di gocce di sangue con l'urina, le feci o lo sperma come normale conseguenza della biopsia stessa.
- Consultare il Medico curante ed eventualmente il Medico di guardia di questo Reparto in caso di sanguinamenti profusi, febbre elevata (più di 38°) o impossibilità alla minzione.
- Informare sempre il Medico Urologo prima dell'inizio dell'esame in caso di assunzione di farmaci che diminuiscono la capacità di coagulazione del sangue (Aspirina, Tiklid, Persantin, Eparina, Coumadin, Sintrom, etc.).

In tal caso è necessario SOSPENDERE la terapia anticoagulante secondo lo schema qui sotto suggerito e **SOLO** previa indicazione del medico curante:

terapia con TICLOPIDINA

- sospendere 7 giorni prima

terapia con ACIDO ACETILSALICILICO

- sospendere 5 giorni prima

**terapia con COUMADIN o SINTROM,
CLOPIDOGREL (Plavix o similari)**

- sospendere 7 giorni prima e sostituire con seleparina da 0,4 a 0,6 1 f/sc o ASA a seconda del parere del medico di Famiglia o dello Specialista che ha consigliato la terapia anticoagulante. In caso di assunzione di ASA è necessario limitare il n. di prelievi prostatici.

Nel caso di assunzione di COUMADIN O SINTROM, il controllo del PT – PTT va eseguito il giorno prima della biopsia e portato l'esito allo specialista.

In caso di impossibilità a presentarsi si prega di avvertire almeno 48 ore prima.